

Catálogo de especies de la familia Cactaceae en Costa Rica

Especie	Estatus	Distribución Altitudinal	Floración	Estado de conservación	Testigo
<i>Acanthocereus hirschtianus</i> (K. Schum.) Lodé	Nativa	0–100 m (–1200 m cult.)	mar., abr.	Preocupación menor (LC)	J. F. Morales 7938; (CR)
<i>Acanthocereus tetragonus</i> (L.) Hummelinck	Nativa	0–100(–300) m (–1150 m cult.)	abr.–jul.	Preocupación menor (LC)	B. Hammel et al. 18494; (CR)
<i>Deamia testudo</i> (Karw. ex Zucc.) Britton & Rose	Nativa	50–600 m	may. (cult.), jun.	Preocupación menor (LC)	M. Grayum 11656; CR, MO)
<i>Epiphyllum cartagense</i> (F. A. C. Weber) Britton & Rose	Nativa	650–1800 msnm	feb.–jun., ago., set., dic.	Preocupación menor (LC)	G. Herrera 6339; CR
<i>Epiphyllum columbiense</i> (F. A. C. Weber) Dodson & A. H. Gentry	Nativa	0–500 m	abr. (cult.), oct. (cult.), nov.	No evaluado (NE)	B. Hammel 27096; (CR)
<i>Epiphyllum grandilobum</i> (F. A. C. Weber) Britton & Rose	Nativa	(0–)50–950(–1300) m	jun., jul.	Casi amenazado (NT)	Hammel et al. 14214; (CR, MO)
<i>Epiphyllum hookeri</i> Haw.	Nativa	0–900(–1200) m	abr.–dic.	Preocupación menor (LC)	G. Davidse & H. Herrera 31226; (CR, MO)
<i>Epiphyllum lepidocarpum</i> (F. A. C. Weber) Britton & Rose	Nativa	1400–2100+ m	ene., abr.	En Peligro (EN)	J. F. Morales et al. 2296; (CR)
<i>Epiphyllum thomsonianum</i> (K. Schum.) Britton & Rose	Nativa	0–1500 m	feb., ago.–oct.	Preocupación menor (LC)	Hammel et al. 20393; (CR)
<i>Mammillaria columbiana</i> Salm-Dyck	Nativa		(cult.) ene.–mar., dic.; fr. set.).	Preocupación menor (LC)	B. Hammel 23363; (CR, MO)
<i>Marshallocereus aragonii</i> (F. A. C. Weber) Backeb.	Nativa	0–800 m (–1400 m cult.)	may., [jun.], ago.	Preocupación menor (LC)	U. Chavarría 789; (CR, MO)
<i>Melocactus curvispinus</i> Pfeiff.	Nativa	0–400 m	abr. (cult.), ago.	Preocupación menor (LC)	M. Grayum & Espinoza 11686; (CR)
<i>Opuntia guatemalensis</i> Britton & Rose	Nativa	0–500 m	ene.–mar., jun., dic.	Preocupación menor (LC)	Hammel et al. 18849; (CR, MO)
<i>Opuntia lutea</i> (Rose) D. R. Hunt	Nativa		(cult.) feb., jun., (Nic.) ene., jun., dic.	Datos deficientes (DD)	U. Chavarría 827; (CR, MO)
<i>Pereskia lychnidiflora</i> DC.	Nativa	0–100 m	feb., may., jun., oct.	Preocupación menor (LC)	F. G. Stiles s.n.; (USJ-23876)
<i>Pseudorhipsalis acuminata</i> Cufod.	Nativa	0–1100 m	feb.–jun.	Casi amenazado (NT)	M. Grayum 6953; CR, MO
<i>Pseudorhipsalis amazonica</i> (K. Schum.) Ralf Bauer	Nativa	200–900 m	mar.	Preocupación menor (LC)	E. Alfaro & González 4373; (CR, MO)

Catálogo de especies de la familia Cactaceae en Costa Rica

Especie	Estatus	Distribución Altitudinal	Floración	Estado de conservación	Testigo
<i>Pseudorhipsalis himantoclada</i> (Rol.-Goss.) Britton & Rose	Nativa	0–650(–1100+) m	feb., ago.– oct., dic.	Casi amenazado (NT)	J. Solomon 19261; (CR, MO)
<i>Pseudorhipsalis lankesteri</i> (Kimnach) Barthlott	Endémica	600–1500+ m	(?)	Datos deficientes (DD)	J. F. Morales 4326; CR
<i>Pseudorhipsalis ramulosa</i> (Salm-Dyck) Barthlott	Nativa	(50–)250–1500 m	abr., set.	Preocupación menor (LC)	E. Bello 11; (CR, MO)
<i>Rhipsalis baccifera</i> (Mill.) Stearn	Nativa	0–900(–1450) m	feb.–may.	Preocupación menor (LC)	G. Herrera 1780; (CR)
<i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC	Nativa	(450–)700–1600+ m	(cult.) mar.	Preocupación menor (LC)	J. F. Morales 2757; (CR, MO)
<i>Selenicereus calcaratus</i> (F.A.C. Weber) D.R. Hunt	Endémica	(0?–)1300–1800 m	feb.–abr.	En Peligro (EN)	J. F. Morales 13763; (CR)
<i>Selenicereus costaricensis</i> (F.A.C. Weber) S. Arias & N. Korotkova	Nativa	0–800(–1400+) m	abr.–set.	Preocupación menor (LC)	B. Hammel & Pérez 22760; (CR, MO)
<i>Selenicereus haberi</i> Hammel	Endémica	500–1200 m	abr., jul.	No evaluado (NE)	B. Hammel & O. Hyams 28052; (CR)
<i>Selenicereus inermis</i> (Otto) Britton & Rose	Nativa	ca. 300 m (–1200 m cult.);	(cult.) abr., may.	Preocupación menor (LC)	B. Hammel 24274; (CR)
<i>Selenicereus monacanthus</i> (Lem.) D.R. Hunt	Nativa	50–700 m (–1200 m cult.)	abr., may., jun. (cult.), set. (cult.).	Preocupación menor (LC)	B. Hammel & Pérez 26719; (CR)
<i>Selenicereus stenopterus</i> (F.A.C. Weber) D.R. Hunt	Endémica	0–800(–1000) m (–1200 m cult.)	Fl. abr., may., ago., set.	Vulnerable (VU)	M. M. Chavarría 576; (CR, MO)
<i>Selenicereus tonduzii</i> (F.A.C. Weber) S. Arias & N. Korotkova	Endémica	(1000–)1250– 2200+ m	Fl. ene., feb., dic.	Vulnerable (VU)	J. F. Morales 7089; (CR)
<i>Selenicereus wercklei</i> (F. A. C. Weber) Britton & Rose	Endémica	500–1200(–1350) m	abr.–jun.	No evaluado (NE)	N. Zamora et al. 2413; (CR)
<i>Weberocereus bradei</i> (Britton & Rose) G. D. Rowley	Endémica	0–850 m	ene., mar.– jun.	Vulnerable (VU)	B. Hammel & Aguilar 18190; CR
<i>Weberocereus frohningiorum</i> Ralf Bauer	Endémica	1200–1400+ m	abr., may., ago.	En Peligro crítico (CR)	J. F. Morales 8118; (CR, MO, USJ)
<i>Weberocereus imitans</i> (Kimnach & Hutchison) D. R. Hunt	Endémica	0–900 m	jun., nov.	En Peligro (EN)	R. Aguilar et al. 3735; CR
<i>Weberocereus trichophorus</i> H. Johnson & Kimnach	Endémica	0–100 (–350?) m	feb., mar., oct., nov.	En Peligro (EN)	B. Hammel 18140; (CR)
<i>Weberocereus tunilla</i> (F. A. C. Weber) Britton & Rose	Nativa	0–1800+ m	ene.–oct., dic.	Preocupación menor (LC)	B. Hammel 22761; (CR)