



Catálogo de Especies de Garzas de Costa Rica

Especie	Nombre Común	Estatus	Distribución Altitudinal	Fecha de reproducción (especies residentes)	Estado de conservación Local
<i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)	Avetoro neotropical	residente	0-600 msnm	época lluviosa	Preocupación Menor (LC)
<i>Botaurus lentiginosus</i> (Rackett, 1813)	Avetoro norteño	migratoria	0-50 msnm		Preocupación Menor (LC)
<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	Avetorillo pantanero	residente	0-600 msnm	época lluviosa	Preocupación Menor (LC)
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	Garza tigre de selva	residente	0-500 msnm	época lluviosa	Preocupación Menor (LC)
<i>Tigrisoma fasciatum</i> Such, 1825	Garza tigre de río	residente	100-900 msnm	época lluviosa	Preocupación Menor (LC)
<i>Tigrisoma mexicanum</i> Swainson 1834	Garza tigre cuellinuda	residente	0-500 msnm	todo el año	Preocupación Menor (LC)
<i>Ardea herodias</i> Linnaeus 1758	Garzón azulado	residente	0-1500 msnm		Preocupación Menor (LC)

<i>Ardea alba</i> Linnaeus 1758	Garza real	residente-migratoria	0-1500 msnm	época lluviosa	Preocupación Menor (LC)
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	Garza silbadora	desconocido	0-30 msnm		Preocupación Menor (LC)
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	Garceta nivosa	residente-migratoria	0-1500 msnm	época lluviosa	Preocupación Menor (LC)
<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	Garzeta azul	residente-migratoria	0-1500 msnm	época lluviosa	Preocupación Menor (LC)
<i>Egretta tricolor</i> Müller, 1776	Garceta tricolor	residente-migratoria	0-1500 msnm	época lluviosa	Preocupación Menor (LC)
<i>Egretta rufescens</i> (Gmelin, 1789)	Garceta rojiza	migratoria	0-1200 msnm		Casi Amenazada (NT)
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Garza bueyera	residente	0-2500 msnm	época lluviosa	Preocupación Menor (LC)
<i>Butorides virescens</i> (Linnaeus, 1758)	Garcilla verde	residente-migratoria	0-1800 msnm	epoca lluviosa	Preocupación Menor (LC)
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	Garcita rallada	migratoria	0-100 msnm		Preocupación Menor (LC)
<i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789)	Garza pechicastaña	residente	0-50 msnm	epoca lluviosa	Vulnerable (VU)
<i>Nycticorax nycticorax</i> Linnaeus 1758	Martinete coroninegro	residente-migratoria	0-1000 msnm	todo el año	Preocupación Menor (LC)
<i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	Martinete coroniamarillo	residente-migratoria	0-1000 msnm	final epoca seca-inicios lluviosa	Preocupación Menor (LC)
<i>Cochlearius cochlearius</i> Linnaeus 1766	<i>Cochlearius cochlearius</i>	residente	0-1200 msnm	todo el año	Preocupación Menor (LC)